



De dosering per dag, afhankelijk van het lichaamsgewicht

Gebruik:

Kinderen van 3 t/m 10 jaar 1 druppel per dag

Kinderen vanaf 11 jaar en volwassenen
1 druppel per 20 kilo lichaamsgewicht

Dit voedingssupplement is niet geschikt voor kinderen tot 3 jaar

De olie kan op een theelepel gedoseerd worden en direct ingenomen worden of bijvoorbeeld op een stukje brood, of door het eten gedaan worden. De olie wordt goed opgenomen bij een vet bevattende maaltijd



Productie en distributie door:



K2 Medical Care U.G.
Gartenstraße 19 • 49744 Geeste, Duitsland

Tel. 0049 5907 9494-582

info@k2-medicalcare.nl
www.k2-medicalcare.nl

K2 mono forte olie

100 microgram vitamine K2 per druppel

 **UW VITAMINE K2
SPECIALIST**

Handige dosering met behulp van pipet

Vitamine K2 ondersteunt de botten en de bloedstolling

Vitamine K2 (MK-7)

Vitamine K2
gemaakt uit de
moleculen
van rozenblaadjes

Vrij van soja
allergenen

De olie bestaat uit
MCT olie, en is neutraal
van smaak

Inhoud 20 ml, voor 500 druppels

Bij een dagdosering van
4 druppels per dag,
is de inhoud genoeg
voor 4 maanden



Wat is de functie van vitamine K2?



K2 Mono Forte Olie, de ideale suppletie voor vitamine D3 consumenten: vitamine D3 draagt bij aan de opname van calcium uit de voeding en daarna draagt K2 bij aan de opname van het calcium in de botten

Vitamine K draagt bij aan een goed verloop van de bloedstolling

Vitamine K2 is goed voor het skelet



Heeft u een vitamine K2 tekort?

De K2 Control geeft een indruk van de elasticiteit van uw bloedvaten

De meting is geen diagnose

Laat hier een screening van de kleine bloedvaten uitvoeren


De meting met de K2 Control is gratis, pijnloos en duurt maar drie minuten

Vraag hier naar de meting wij helpen u graag



Samenstelling per druppel		% RI = referentiewaarde inname volwassenen
Vitamine K2 (MK7)	100 mcg	133 %

Aanbevolen dosering

-  1 tot 7 druppels per dag, afhankelijk van het lichaamsgewicht
-  Aanbevolen dosering is 5 microgram K2 per kilo lichaamsgewicht

Vitamine K2 niet nemen als u antistollingsmiddelen van het coumarinetype gebruikt, en u hiervoor gebruik maakt van de trombose dienst